



FICHE TECHNIQUE N°1 LAVAGES INTRA PERITONEAUX

Emetteur :

A préciser

OBJECTIFS :

- Laver la cavité péritonéale en présence d'effluent non conforme.
- Diminuer les douleurs abdominales liées à une péritonite.

QUAND ?

- Dès l'arrivée du patient mettre en drainage.
- Faire un prélèvement cyto- bactériologique avec mise en culture sur flacons à hémoculture.
Prélever sur la poche drainée dans le service et la poche apportée par le patient.
- Faire une analyse sur bandelette urinaire à la recherche de leucocytes, de nitrite et de sang.

COMMENT ?


- Effectuer 3 cycles (infusion et drainage) sans interruption avec une solution isotonique.
- Infuser une quatrième poche (isotonique ou nutrineal) avec une antibiothérapie et une héparinisation selon la prescription médicale.

PRECAUTIONS

Ne **pas** utiliser de **poche hypertonique** les premiers jours d'une péritonite.

REDACTION	Date et Visa	VALIDATION	Date et Visa	APPROBATION	Visa	Date d'Application
Prénom, NOM <i>Fonction du rédacteur (en italique)</i>		Forme : Prénom, NOM <i>Qualiticien</i>		Prénom, NOM <i>Fonction du responsable hiérarchique (en italique)</i>		
		Fond : Prénom, NOM <i>Fonction de l'expert métier (en italique)</i>				

(*) : En cas de rédaction en groupe, visa du chef de projet uniquement et inclure la liste des participants en dernière page du document (pied de page en Arial 8)

 CENTRE HOSPITALIER de NIORT	PROCEDURE F : GESTION DES COMPLICATIONS EN DP	Codification (Arial 10)
	FICHE TECHNIQUE N°2 INJECTION D'UN MEDICAMENT DANS UNE POCHE DE DIALYSE	Version n° 2 MAJ Date : 19/01/2015 (Arial 10)
Emetteur : A préciser		Pagination : 1/2 (Arial 10)

OBJECTIFS :

- Traiter une péritonite.
- Dissoudre la fibrine présente dans le dialysat.
- Injecter un produit dans un but diagnostic

QUAND :

- Sur prescription médicale

PARTICULARITE :

- L'injection du produit se fait dans le site d'injection situé sur la poche d'infusion neuve.

MATERIEL :

- 1 masque,
- Solution hydro alcoolique,
- 4 compresses stériles,
- Bétadine alcoolique,
- Médicament prescrit et le solvant si besoin,
- 1 seringue adaptée à la dose du médicament,
- 1 aiguille à prélèvement,
- 1 aiguille fine.

TECHNIQUE :

- Mettre le masque,
- Se laver les mains,
- Vérifier le médicament (nom, posologie, date de péremption, dosage),
- Ouvrir l'emballage des compresses, de la seringue et des aiguilles,
- Imbiber les compresses de bétadine alcoolique,
- Désinfecter le bouchon du médicament avec la compresse bétadinée,
- Ouvrir avec asepsie le solvant,

REDACTION	Date et Visa	VALIDATION	Date et Visa	APPROBATION	Visa	Date d'Application
Prénom, NOM <i>Fonction du rédacteur (en italique)</i>		Forme : Prénom, NOM		Prénom, NOM <i>Fonction du responsable hiérarchique (en italique)</i>		
		<i>Qualiticien</i>				
		Fond : Prénom, NOM <i>Fonction de l'expert métier (en italique)</i>				

(*) : En cas de rédaction en groupe, visa du chef de projet uniquement et inclure la liste des participants en dernière page du document (pied de page en Arial 8)

- **Désinfecter les mains avec la solution hydro alcoolique,**
- Prélever le solvant et diluer le médicament avec l'aiguille à prélèvement,
- Mélanger et prélever la solution,
- Changer d'aiguille (mettre l'aiguille fine),
- Préparer la poche selon le mode habituel,
- **Désinfecter les mains avec la solution hydro alcoolique,**
- Désinfecter le site d'injection avec une compresse imbibée de bétadine alcoolique (temps de contact minimum 30 secondes),
- **Injecter le médicament lentement dans le site d'injection en maintenant l'aiguille parallèlement à la tubulure du site. Il est facile de traverser cette tubulure si on introduit l'aiguille obliquement. Cet incident nécessite le changement de la double poche, de l'aiguille et éventuellement de la solution à injecter.**
- Retirer aiguille et seringue.

- **Attention :**
 - Vérifier que le médicament injecté est bien mélangé à la solution de dialyse. Parfois il est nécessaire de retourner la poche plusieurs fois.
 - Si l'infusion ne correspond pas à la totalité de la poche initiale (1500ml / 2000ml), **injecter** le produit dans le site **après** avoir enlevé les 500ml sinon le patient ne recevra pas la totalité du traitement.
- Noter l'injection sur le cahier de suivi et la feuille de prescription.
- Continuer les manipulations selon le protocole.