

	FICHE TECHNIQUE	NH-FT-018
	CONDUITE A TENIR LORS D'UNE INFECTION DE L'ORIFICE DE SORTIE DU CATHETER DE DIALYSE PERITONEALE	Version 01 du 09/08/2016
		page 1/1
Entité émettrice : POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-hémodialyse		

Soins dispensés sur prescription médicale :

1. PRELEVEMENT

Effectuer par écouvillonnage un prélèvement bactériologique systématique au niveau de l'orifice de sortie du cathéter et le transmettre en microbiologie pour Examen Cyto-Bactériologique

2. SI INFLAMMATION

traitement local quotidien par Bétadine® Scrub, se référer au protocole de pansement de cathéter de dialyse péritonéale

3. SI SUPPURATION

Antibiothérapie par voie orale ou intraveineuse à discuter selon l'aspect clinique et le germe isolé

Durée minimale du traitement : 14 jours

4. SI ABCES

Si suspicion d' infection du tunnel, faire échographie à la recherche d'un abcès

Si abcès du tunnel : ABLATION DU CATHETER

CYCLE DE VALIDATION		
Rédaction	Vérification	Approbation
<i>Christophe GREGOIRE, Thierry LOBBEDEZ</i> Infirmier(e) (IDE) - CHU\POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-Hémodialyse, Chef de Service - CHU\POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-Hémodialyse 09/08/2016 11:30:48, 03/08/2016 13:59:40	<i>Thierry LOBBEDEZ</i> Chef de Service - CHU\POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-Hémodialyse 09/08/2016 11:42:48	<i>Brigitte COURTOIS (par Caroline SAINT)</i> Directeur - CHU\DIRECTION QUALITE ET DROITS DES PATIENTS 09/08/2016 11:48:26